

A QUETIAPIN HATÁSA PSZICHOTIKUS DEPRESSZIÓBAN

Sárosi Andrea, Molnár Annamária, Faludi Gábor

Semmelweis Egyetem, Kútvölgyi Klinikai Tömb, Pszichiátriai Klinikai Csoport

ÖSSZEFOGLALÁS

Az irodalmi adatok szerint a depressziós betegek 16–54%-ában észlelhető pszichotikus depresszió. A kórállapot leghatékonyabb kezelési formája az egyhangzó adatok szerint az antidepresszívum-antipszichotikum kombinált kezelés. Tanulmányunk célja az volt, hogy retrospektív módon megvizsgáljuk a quetiapin – ún. atípusos antipszichotikum – és különböző antidepresszívum kombináció hatásosságát a pszichotikus depressziós betegek kezelésében. A DSM-IV szerint pszichotikus depresszió diagnózissal kiírt, quetiapin antidepresszívummal kezelt (10 nő, 1 férfi, átlagéletkor 49,7 év) betegek adatait dolgoztuk fel. Az eredményeket összehasonlítottuk más atípusos antipszichotikum+antidepresszívum kombinációval kezelt (8 nő, 3 férfi, átlagéletkor 49,2 év), életkor és nem tekintetében megfelelő csoport kezelési adataival. A quetiapin csoportban 9 beteg (82%) sokat javult a kórházból való hazabocsátásig, míg a kontroll csoportban 7 páciens (64%) állapota javult sokat, a különbség nem szignifikáns (“t” $p=0,3622$, ns). A quetiapin mindvégig jól tolerálható volt. A quetiapin+antidepresszívum kombinációt mindvégig jól tolerálták a betegek. A quetiapint hatékonynak és biztonságosnak találtuk a kezelés során és további vizsgálatok szükségesek annak tisztázására, hogy a szer farmakológiai profiljának köszönhetően önmagában is vagy csak antidepresszívummal kombinálva fejt ki terápiás hatását pszichotikus depresszióban.

KULCSSZAVAK: quetiapin, atípusos antipszichotikum+antidepresszívum kombináció, pszichotikus depresszió

TREATMENT RESPONSE TO QUETIAPINE IN PSYCHOTIC DEPRESSION

In the literature, psychotic depression occurs in an estimated 16% to 54% of all depressed patients. The purpose of this retrospective study was to assess the safety and efficacy of quetiapine in the treatment of psychotic depression. We analysed the data of hospitalized patients with the diagnosis of psychotic depression according to DSM-IV who had been treated with a combination of quetiapine and an antidepressant. An age- and sex-matched control group was set up of hospitalized patients with psychotic depression treated with a combination of an atypical antipsychotic other than quetiapine and an antidepressant.

Eleven patient with psychotic depression treated with quetiapine (10 women and 1 man; mean age 49,7 yrs) were compared to eleven patients with psychotic depression treated with another antipsychotic (8 women and 3 man; mean age: 49,2 yrs). Nine of eleven patients (82%) who had taken quetiapine showed significant improvement (were very much improved) upon discharge compared to seven of eleven patients (64%) who had received another antipsychotic. All along, quetiapine was well tolerated. We found quetiapine effective and safe in the treatment of psychotic depression. Further investigations are needed to clarify whether quetiapine works in psychotic depression as a monotherapy as well due to its pharmacological profile or just in combination with antidepressants.

KEYWORDS: quetiapine, combination of atypical antipsychotic-antidepressant, psychotic depression