

# ELSŐ ÉS ISMÉTELT ÖNGYILKOSSÁGI KÍSÉRLETET ELKÖVETETT SZEMÉLYEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Balázs Judit<sup>1</sup>, Bitter István<sup>2,3</sup>, Yves Lecrubier<sup>4</sup>, Csiszér Nóra<sup>5</sup>, Koszták János<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Semmelweis Egyetem, Doktori Iskola, Budapest; <sup>2</sup>Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest; <sup>3</sup>E. Lilly Regional GmbH, Area Medical Center, Bécs;

<sup>4</sup>Inserm U 302, Hôpital de la Salpêtrière, Paris; <sup>5</sup>Erzsébet Kórház és Rendelőintézet, Budapest

## ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzők öngyilkossági kísérletet elkövetett személyek között az ismételt elkövetők arányát vizsgálják. Összehasonlítják az ismételt és az első elkövetőket nem megoszlásuk, korábbi pszichiátriai kezelésük és családi pszichiátriai, valamint öngyilkosságra vonatkozó anamnéziséjük alapján. Az Erzsébet Kórház és Rendelő Intézet Krízisintervenció Osztályán száz 18-65 év közötti egymás után felvételre kerülő öngyilkossági kísérletet elkövetett személyt vontak be a vizsgálatukba. Egy félig-strukturált (háttéradat gyűjtése) és egy strukturált interjút (DSM-IV I. tengelyű diagnózis felállítása) felvétele történt. Statisztikai módszerként leíró statisztikát és a chi-próbát alkalmazták. Azt találták, hogy az öngyilkossági kísérletet elkövetett személyek 57%-ának a jelen kísérlet már nem az első volt az életében, 35 (61.4%) volt nő és 22 (38.6%) férfi ( $p < 0,1$ ). Az átlagos öngyilkossági kísérletek száma 4,14 ( $SD=5.2$ ) volt. Az ismételt öngyilkosságot elkövetők 77.2%-nak szerepel az anamnézisében pszichiátriai kezelés, míg ez az érték 35,6% azok között, akiknek a jelen kísérlet életükben az első volt ( $p < 0,005$ ). Nem volt szignifikáns összefüggés az öngyilkossági kísérletek száma és a korábbi pszichiátriai kezelés között. Szintén nem volt szignifikáns összefüggés az ismételt öngyilkossági kísérlet és az elsőfokú rokonok öngyilkossági kísérlete között. Ezzel szemben szignifikáns összefüggés állt fenn az ismételt öngyilkossági kísérlet és az elsőfokú rokonok között előforduló pszichiátriai betegségek között. Az ismételt öngyilkossági kísérletet elkövető személyek magas előfordulása ezen személyek körültekintő gondozására hívja fel a figyelmet.

**KULCSSZAVAK:** öngyilkossági kísérlet, ismételt elkövetők, pszichiátriai kezelés, családi anamnézis

## COMPARISON OF PERSONS WITH FIRST AND REPEATED SUICIDE ATTEMPTS

In the present study the authors examined the percentage of repeaters among suicide attempters and the associations between being repeaters and past psychiatric disorders/treatments, positive family history of psychiatric disorder and suicide. The authors examined 100 consecutive suicide attempters aged 18-65 in the Elisabeth Hospital and Outpatient Clinic in Budapest using a structured interview (Mini International Neuropsychiatric Interview) determining 16, Axis I DSM-IV diagnoses and a semistructured interview collecting background information. Descriptive statistical methods and chi-square test were used. In total 57% of the current attempters were repeaters; 35 (61.4%) were females and 22 (38.6%) were males ( $p < 0,1$ ). Among repeaters the mean number of suicide attempts was 4,14 ( $SD=5.2$ ). Of those who had previously attempted suicide 77.2% had a history of psychiatric treatment, whereas the corresponding figure for those who had not made earlier attempts was 35,6% ( $p < 0,005$ ). Past psychiatric treatment and the number of suicide attempts were not significantly related. There was no significant connection between being a repeater and having a positive family history of suicide. There was significant connection being a repeater and having a positive family history of psychiatric disorders. The high percentage of repeaters among suicide attempters underlines the importance of careful long-term treatment of these patients.

**KEYWORDS:** suicide attempt, repeaters, psychiatric treatment, family history