

CLOZAPIN TERÁPIA MELLETT JELENTKEZŐ GRANULOCYTOPENIA (ESETISMERTETÉS)

Kosza Piroska, Makkos Zoltán

Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, Budapest

Érkezett: 2001. december 1. Elfogadva: 2001. december 22.

ÖSSZEFOGLALÁS

A clozapin terápia mellett jelentkező mellékhatások közül a granulocytopenia illetve az agranulocytosis a legveszélyesebb. A 27 éves schizofren nőbetegnél, akinél clozapin adása mellett granulocytopenia jelentkezett (a granulocytopenia felfedezése időben történt), a clozapin elhagyását követően a granulocytopenia rendeződött. Minden más típusos és atípusos antipszichotikumra azonban terápiaerezisztens volt. Óvatos és alacsonyabb dozírozás mellett újra clozapin adagolást kezdtünk. A gyógyszer hatására pszichésen ismét kompenzálttá vált és a vérkép rendben van.

KULCSSZAVAK: clozapin, granulocytopenia

GRANULOCYTOPENIA AT CLOZAPINE THERAPY

Granulocytopenia and agranulocytosis are considered among the most dangerous adverse effects of clozapine. 27 years old female with schizophrenia, who had granulocytopenia during clozapine therapy and the adverse reaction were recognized early, recovered after to leave the clozapine. She was not responder to other typical and atypical antipsychotics. We started with low dose clozapine therapy with strict controll and the clozapine therapy is succesful.

KEYWORDS: clozapine, granulocytopenia