

DIAGNÓZIS ÉS PSZICHOPATOLÓGIA ÖNGYILKOSSÁGI KÍSÉRLETET ELKÖVETŐK CSOPORTJÁBAN

Előzetes közlemény

Fekete Sándor, Vörös Viktor, Osváth Péter

Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai és Orvosi Pszichológiai Klinika, Pécs

Érkezett: 2001. november 14. Elfogadva: 2001. december 10.

ÖSSZEFOGLALÁS

A szuicid kísérletet elkövetett páciensek diagnosztikus megoszlására nézve számos részben eltérő vizsgálati eredmény található a szakirodalomban, melyek hátterében feltehetően elsősorban a vizsgálóeljárások módszertani különbségei állnak.

A jelen vizsgálat a WHO/EURO kutatás keretében a felvevő területre vonatkozó teljes körű adatfelvételre törekedve (eddig a szuicid kísérleteket ilyen módon nem monitorizálták) a klinikai BNO és a strukturált klinikai interjú (EPSIS) által felállított diagnózisokat hasonlította össze a MINI strukturált diagnosztikus interjúval nyert kórismékkal. A monitorizált (n=850) és strukturált-EPSIS (n=101) interjúk klinikai diagnózisok a MINI (n=50) diagnosztikus interjúhoz képest az alkalmazkodási zavar (krízis) magas arányát, az affektív, szorongásos és személyiségzavaros kórismék relatíve alacsonyabb arányát találták. A lehetséges alternatív interpretációk közül a szerzők tárgyalják a vizsgálatok korlátai és erősségei mellett a subthreshold diagnózisok lehetőségét, illetve az alkalmazott eszközök sajátosságait, hangsúlyozva a módszerek standardizálásának, az interjúerek képzésének és a szemléletek közelítésének fontosságát.

KULCSSZAVAK: szuicidium, diagnózis, MINI interjú, pszichopatológia

DIAGNOSIS AND PSYCHOPATHOLOGY AT THE GROUP OF PARASUICIDE

The diagnostic distribution of suicide attempts has been found to be different in several studies, in part on the basis of the different diagnostic tools. Suicide attempts are not being systematically recorded in Hungary, so a monitoring project within the framework of the WHO/EURO multi-centre study on suicidal behavior was started in Pecs catchment area three years ago. The study is aimed to monitor all the medically treated suicide attempts and to predicts future acts through a follow-up. Until now 850 monitored suicidal events have been collected; 101 structured inter-views (EPSIS I) have been conducted in this period. The aim of this study was to investigate the diagnostic distribution of suicide attempts by clinical (ICD 10; n= 850) and by structural interviews (EPSIS, N=101; and MINI, n=50) Rate of the accommodation disorders was found to be relative higher, of the affective and anxious diseases was relatively lower in the EPSIS and monitor investigations compared to MINI. Strengths and limits of the tools are discussed; role of subthreshold diagnoses, standardisation of the used methods and training of interviewers are pointed out.

KEYWORDS: suicide, diagnosis, MINI interview, psychopathology