

LITHIUM TERÁPIA IDŐSKORBAN

Ferencz Csaba, Szabó Magda

Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet,
Belgyógyászati-Pszichiátriai Osztály

LITHIUM THERAPY IN OLD AGE

The authors are aware that little new can be said concerning the lithium therapy and its side effects. Still, a long lasting prophylactic therapy extending into old age may constitute a higher risk with patients over 65 the growing inclination to interactions, the functional or organic vulnerability of the electrolyt balance and the internal parenchymal organs are contributory factors to a higher number of complications experienced in this age group. The authors emphasize the importance of the close and continuous observation of clinical symptoms because the level of lithium in serum is in many cases not proportionate to these symptoms.

KEYWORDS: lithium therapy, old age, risk, monitoring

ÖSSZEFOGLALÁS

A szerzők tisztában vannak azzal, hogy a lithium kezeléssel és annak szövődéséről újat mondani nem lehet. Az idős korra átnyúló profilaxis ugyanakkor nagyobb kockázatvállalást jelenthet egy adott esetben az alkalmazó pszichiáter számára. Az idős korú (WHO: 65 év felett) betegeknél a gyakori társbetegségek, az egyre növekvő gyógyszer interakciók, az elektrolit háztartás és a parenchimás szervek funkcionális organikus eszékesége hozzájárul a szaporodó szövődések kialakulásához. Hangsúlyozzák, hogy különösen fontos a klinikai tünetek folyamatos figyelése, hiszen a mért serum-lithium szintek gyakran nincsenek párhuzamban azok súlyosságával.

KULCSSZAVAK: lithium terápia, idős kor, kockázat, monitoring

