

SERTRALINE TERÁPIÁS HATÁSA MENSTRUÁLIS CIKLUS LUTEÁLIS FÁZISÁBAN ALKALMAZVA, PREMENSTRUÁLIS DYSPHORIÁB

Leszek Tomasz Ros

Central University Teaching Hospital with Polyclinic, Armed Forces School of Medicine, Independent Public Health Care Institution, Warsaw, Poland

THERAPEUTIC EFFECTS OF SERTRALINE ADMINISTERED DURING LUTEAL PHASE OF THE MENSTRUAL CYCLE IN THE TREATMENT OF PREMENSTRUAL DYSPHORIA

Detailed psychiatric examination in 23 years old patient revealed premenstrual dysphoria syndrome of high intensity. Premenstrual dysphoria syndrome is manifested always with high writability and usually slight aggression and anxiety. As other authors, in turn obtained good results of treatment these symptoms with sertraline.

KEYWORDS: premenstrual dysphoria, anxiety, irritability, aggression, sertraline

ÖSSZEFOGLALÓ: A szerző a premenstruális diszfória gyógykezelését tárgyalja, a közölt esettanulmányban 23 éves nőbeteg esetét ismerteti, aki hangulati nyomottságra, szorongásra, agresszivitásra, szomatizációra panaszkodott a szubsztitúció előtt, 100 mg sertralin alkalmazása a luteális fázisban panaszmentessé tette.

KULCSSZAVAK: premenstruális diszfória, szorongás, irritabilitás, agresszió, sertralin

