

NEMI KÜLÖNBSÉGEK AZ ILLEGÁLIS DROGHASZNÁLATBAN, ILLETVE A SZEREK OKOZTA MELLÉKHATÁSOKBAN MAGYARORSZÁGI SZÓRAKOZÓHELYEKEN KÉSZÜLT VIZSGÁLAT ALAPJÁN

István Kecskés, Zoltán Rihmer, Gergely Huba Kiss, Kitty Kiss
National Institute of Psychiatry and Neurology, Budapest

ABSTRACT

An investigation was carried out to examine the patterns of illicit drug consumption and the drug related anxiety-like side effects amongst Hungarian youth in different entertainment venues with special interest in gender differences. The study was managed in six dance clubs in countrywide between 1998-1999. Five-hundred five Hungarian youth participated in the investigation. A semi-structured self-completion questionnaire was developed consisting of questions about drug consumption, anxiety-like side effects, gender, age and education. As the results show, more than one quarter of the participants (25.54%) had ever used illicit drugs. Males were more likely to use illicit drugs, both occasionally and regularly. Female drug users showed more anxiety-like side effects. Drugs caused different side effects in the two genders. Most of the males used more than one drug. Cannabis was the drug most commonly used, was the drug most likely to be used without other drugs, and associated with the lowest rates of side effects. In conclusion, in spite of the special population, our results are consistent with previous findings, and reinforce the existing of significant gender differences in drug consumption habits and drug-related side effects.

KEYWORDS: gender differences, drug consumption, side effects

ÖSSZEFOGLALÁS

Magyar fiatalok drogfogyasztási szokásait, illetve a szerek által okozott szorongásos tüneteket vizsgáltuk különböző szórakozóhelyeken, különös tekintettel a nemek közötti különbségekre. A vizsgálatot 1998-ban és 1999-ben végeztük, az ország hat különböző diszkójában. 505 magyar fiatal vett részt a vizsgálatban. Félig struktúrált kérdőívet szerkesztettünk, mely kérdéseket tartalmazott a drogfogyasztási szokásokkal, a drogok által okozott mellékhatásokkal, a válaszadó nemével, korával és végzettségével kapcsolatban, s melyet a válaszadó maga töltött ki. Eredményeink szerint a válaszadók több mint negyede (25.54%) használt már drogot. Mind a rendszeres, mind az alkalmi fogyasztók között a férfiak gyakrabban voltak találhatóak.

A drogot használó nők gyakrabban jeleztek szorongásos mellékhatásokat, mint a férfiak. A két nemben eltérő mellékhatásprofilot találtunk. A férfiak többsége több szert is használt egyszerre. A marihuána volt a leggyakrabban használt szer, ezt használták leggyakrabban önmagában, s ez okozta a legkevesebb mellékhatást. A fentiek alapján, a vizsgált populáció speciális volta ellenére, eredményeink egybehangzóak a korábbi tapasztalatokkal, s megerősítik, hogy jelentős nemi különbségek állnak fenn a drogfogyasztási szokásokat és a drogok mellékhatásait illetően.

KULCSSZAVAK: nemi különbség, drogfogyasztás, mellékhatások

