

SZUICUDUM MAJOR AFFEKTÍV PSZICHÓZISBAN

Kiss Kitty, Rihmer Zoltán

Department of Psychiatry No XIII, National Institute for Psychiatry and Neurology

ABSTRACT

Suicide is a major health problem everywhere in the world, and its prevention receives more and more attention nowadays. After the short summary of suicide risk factors, the authors review the clinically most useful (psychiatric-medical) suicide risk factors that can help health care workers in the identification and management of groups at higher suicide risk. The authors demonstrate that among different subgroups of major affective disorders (unipolar major depression, bipolar I and II disorder), bipolar II patients are at the highest risk of attempted and completed suicide. In the remaining part of this review the special and clinically explorable suicide risk factors (with particular regards to grief-reaction) that can help identifying the high risk bipolar patients are discussed in detail

KEYWORDS: depression, suicide, suicide risk factors, bipolar I disorder, bipolar II disorder

ÖNGYILKOSSÁG AFFEKTÍV KÓRKÉPEKBEN. RIZIKÓFAKTOROK, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A GYÁSZ-REAKCIÓRA

Az öngyilkosságnagy problémát jelent mindent a világon, és prevenciójára mind több figyelem irányul manapság. Az öngyilkossági rizikófaktorok rövid összefoglalása után, a szerzők áttekintik a klinikailag legjelentősebb (pszichiátriai-orvosi) öngyilkossági rizikófaktorokat, melyek segíthetnek az egészségügyben dolgozóknak a veszélyeztetett csoportba tartozók azonosításában és kezelésében. A szerzők demonstrálják, hogy a major affektív zavarok különböző alcsoportjai közül (unipoláris major depresszió, bipoláris I és bipoláris II zavar), a bipoláris II betegek a legveszélyeztetettebbek az öngyilkossági kísérlet és befejezett öngyilkosság tekintetében. Ezen áttekintés fennmaradó részében specifikus és klinikailag feltárható öngyilkossági rizikófaktorokat (különös tekintettel a gyász-reakcióra) tárgyaljuk részletesebben, melyek segíthetnek a magas rizikójú bipoláris betegek azonosításában.

KULCSSZAVAK: depresszió, szuicidium, szuicid rizikótényezők, bipoláris I tavar, bipoláris II zavar
