

REBOXETIN HATÁSOSÁGA ÉS TOLERÁLHATÓSÁGA

Péter Gaszner

National Institute of Psychiatry and Neurology, Budapest

EFFICACY AND TOLERABILITY OF REBOXETINE COMPARED WITH DESIPRAMINE IN HOSPITALISED PATIENTS WITH DEPRESSION

The efficacy and tolerability of reboxetine, a novel, selective noradrenaline reuptake inhibitor (selective NRI), was evaluated in a 4-week double-blind, placebo-controlled, comparative trial with desipramine.

Two hundred and fifty-eight hospitalised patients with major depression entered the study and were randomised to receive reboxetine 4-8 mg/day or desipramine 100-200 mg/day on an increasing dosage regimen, or placebo.

Reboxetine was associated with a significantly higher therapeutic response rate than placebo ($p < 0.05$) by all efficacy measures used, and a consistently earlier onset of therapeutic effect than desipramine ($p < 0.05$). Only three adverse events showed a significant difference in frequency between the groups: dry mouth and blurred vision with desipramine and urinary hesitancy with reboxetine. There were no abnormal laboratory parameters or vital signs. Patients treated with reboxetine had significantly higher ($p < 0.05$) mean scores on the Clinical Global Impression Efficacy Index than those receiving desipramine or placebo, indicating a superior benefit/risk ratio for reboxetine treatment.

Reboxetine is an effective and well-tolerated antidepressant for the treatment of hospitalised patients with major depression.

KEYWORDS: reboxetine, desipramine, selective noradrenaline reuptake inhibitor, major depressive disorder

ÖSSZEFOGLALÁS

Reboxetin, új, szelektív noradrenalin visszavétel gátló (szelektív NRI) összehasonlítása történt négy hetes, kettős vak, placebo-kontrollált vizsgálattal, dezipraminnal összevetve.

258 pszichiátriai osztályon kezelt major depressziós beteg vett részt a vizsgálatban; random módon reboxetint (4-8 mg/nap), 100-200 mg/nap dezipramint vagy placebót kaptak.

A reboxetin minden tesztvizsgálatban szignifikánsan nagyobb terápiás hatással rendelkezett ($p < 0.05$), mint a placebo; a hatás hamarabb jelentkezett, mint a dezipraminnál. Mellékhatások közül a szájszárazság és homályos látás volt gyakoribb desipramin, illetve vizelet-bizonytalanság reboxetin mellett. A laborvizsgálatok nem mutattak eltérést.

Megállapítható, hogy major depresszióban a reboxetin hatásos és jól tolerálható antidepresszáns.

KULCSSZAVAK: reboxetin, dezipramin, szelektív noradrenalin visszavétel gátló, major depresszió
