

# A Young-féle sématartományok hatása az interperszonális funkció sérülésének súlyosságára személyiségzavarral élők körében

Pribula Viktória<sup>2,3</sup>, Ruscsák Péter<sup>1</sup>, Pongrácz Fanni<sup>2,3</sup>, Gubányi Sára<sup>1</sup>, Fejes Zsófia<sup>1</sup>, Adorjáni Tomay<sup>5</sup>, Sándor Fanni<sup>1</sup>, Szántó Lili<sup>1</sup>, Kundrák Villő<sup>6</sup>, Elek Livia Priyanka<sup>2</sup>, Vizin Gabriella<sup>4</sup>, Gonda Xénia<sup>2,3</sup>

<sup>1</sup>Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest


<sup>2</sup>Semmelweis Egyetem, Klinikai Pszichológia Tanszék, Budapest

<sup>3</sup>Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest


<sup>4</sup>Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék, Budapest

<sup>5</sup>Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest

<sup>6</sup>Szegedi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet, Szeged



Módszer		
Vizsgálati minta	Mérőeszközök	
Akut pszichiátriai osztályon kezelt páciensek	SCID-5-AMPD Strukturált diagnosztikus interjú I. Modul	0-3 pont
Akiket korábban személyiségzavarral diagnosztizáltak/akiknél annak gyanúja merült fel	Személyiségfunkció skála	
102 résztvevő	BNO-11 Személyiségzavar súlyossága kérdőív (PDS-ICD-11)	0-8 pont
	Young-féle séma kérdőív	Aktív/inaktív sématartomány



### Konklúzió

- Az **interperszonális diszfunkció** részben előre jelezhető az egyes **sématartományok** **aktiváltságával** vagy **inaktiváltságával**
- Az **I. sématartomány maladaptív sémái** következetesen azt mutatták, hogy **aktiváltságuk jó előrejelzője** az **interperszonális diszfunkció mértékének**

A szerzők nem számolnak be érdekkonfliktusról.